

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 27/12/2011

## Dénomination du médicament

**LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique  
Paraffine liquide**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique ?
3. COMMENT PRENDRE LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**1. QU'EST-CE QUE LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

### Classe pharmacothérapeutique

LAXATIFS LUBRIFIANTS

(A: appareil digestif et métabolisme)

La paraffine liquide agit par action mécanique en lubrifiant le contenu du côlon et en ramollissant les selles.

### Indications thérapeutiques

Traitement de la constipation occasionnelle.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique ?**

### **Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **Contre-indications**

**Ne prenez jamais LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique dans les cas suivants:**

Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique

Si vous souffrez de douleurs abdominales dont vous ne connaissez pas la cause.

Si vous avez des difficultés de déglutition (avaler correctement) en raison du risque d'inhalation bronchique et de pneumopathie lipoïde.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### **Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**

**Faites attention avec LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique:**

#### **Mises en garde spéciales**

- Chez l'enfant l'administration de laxatifs doit être exceptionnelle, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée; l'utilisation prolongée de paraffine liquide est susceptible de réduire l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K).
- Le traitement médicamenteux de la constipation n'est qu'un adjuvant au traitement hygiéno-diététique qui se compose de:
  - un enrichissement de l'alimentation en fibres végétales et en boissons,
  - la pratique d'activité physique,
  - la rééducation du réflexe de défécation
- En cas de constipation chronique, qui peut être liée à une maladie de l'intestin ou à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie, PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

#### **Précautions d'emploi**

L'administration de paraffine liquide chez les jeunes enfants, les malades alités ou ayant des difficultés à avaler doit être prudente, car elle peut être à l'origine de passage dans les bronches et de troubles respiratoires.

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E 124) et peut provoquer des réactions allergiques.

Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

### **Interactions avec d'autres médicaments**

### **Utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

### **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

#### **Grossesse et allaitement**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse car il peut être à l'origine d'un défaut d'absorption de certaines vitamines essentielles pour votre enfant.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Sportifs**

Sans objet.

### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

### **Liste des excipients à effet notable**

**Informations importantes concernant certains composants de LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique: sorbitol, rouge cochenille A (E 124).**

### **3. COMMENT PRENDRE LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique ?**

#### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

#### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

##### **Posologie**

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT A PARTIR DE PLUS DE 12 ANS.

Adulte: une unidose à renouveler si nécessaire 1 à 3 fois par 24 heures, sans dépasser la posologie maximale de 3 unidoses par 24 heures.

Enfant: selon avis médical.

En cas d'échec du traitement n'augmentez pas les prises, mais prenez l'avis de votre médecin.

##### **Mode et voie d'administration**

Voie orale.

##### **Fréquence d'administration**

La prise se fera à distance des repas:

- soit de préférence le matin à jeun;
- soit 2 heures avant ou après les repas;
- en cas de prise le soir, vous devez éviter de vous aliter dans les deux heures qui suivent et prendre en compte le risque de survenue de l'effet laxatif dans la nuit.

#### **Durée du traitement**

La durée d'utilisation est limitée à 15 jours.

#### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

**Si vous avez pris plus de LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique que vous n'auriez dû:**

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Une utilisation à forte dose de paraffine liquide expose à un risque de:

- stéatorrhée (diarrhée graisseuse),
- suintement anal,
- et une irritation périanale.

Si vous avez pris plus de LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique que vous n'auriez dû, arrêter le traitement et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

#### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

**Si vous avez oublié de prendre LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique:**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

#### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

A fortes doses, possibilités:

- d'écoulement huileux (coloré en rouge) au niveau de l'anus,
- et parfois, d'irritation au niveau de l'anus.

Dans des conditions exceptionnelles ou en raison d'une mauvaise utilisation, possibilités de troubles respiratoires ([voir Précautions d'emploi](#)).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Date de péremption**

Ne pas utiliser LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

### **Conditions de conservation**

Ce médicament est à conserver à une température inférieure à 25°C.

### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Liste complète des substances actives et des excipients**

**Que contient LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique ?**

#### **La substance active est:**

Paraffine liquide .....  
11,734 g

Pour un récipient unidose.

#### **Les autres composants sont:**

Sirop de lactulose, sorbitol, acide citrique monohydraté, gélatine, rouge cochenille A (E 124), composition aromatique, saccharine sodique, eau potable.

### **Forme pharmaceutique et contenu**

**Qu'est-ce que LANSOYL SANS SUCRE (11,734 g/15 g), gel oral en récipient unidose édulcoré à la saccharine sodique et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de gel oral en récipients unidoses. Boîtes de 9, 10 et 220 récipients unidoses.

**Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

#### ***Titulaire***

**JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE**

1, RUE CAMILLE DESMOULINS  
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

#### ***Exploitant***

**JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE**

1, RUE CAMILLE DESMOULINS  
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

***Fabricant***

**FARMEA**

10, RUE BOUCHE THOMAS  
ZAC D'ORGEMONT  
49007 ANGERS CEDEX 01

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.