

AURIGOUTTE

Mis à jour : Jeudi, 20 Mars 2014.

Traitement local des otites

Dans quel cas le médicament AURIGOUTTE est-il prescrit ?

Cette solution auriculaire [antalgique](#) contient un [anesthésique](#) local associé à un [antiseptique](#). Elle est utilisée dans le traitement de certaines otites externes et de leurs manifestations douloureuses.

Présentations du médicament AURIGOUTTE

AURIGOUTTE : solution auriculaire ; flacon compte-gouttes de 15 ml
- Non remboursé - Prix libre

Composition du médicament AURIGOUTTE

	p 100 ml
Lidocaïne chlorhydrate	100 mg
Hexamidine di-isétionate	100 mg

Substances actives : [Hexamidine di-isétionate](#), [Lidocaïne chlorhydrate](#)

Excipients : Éthanol à 95 %, Glycérol

Contre-indications du médicament AURIGOUTTE

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- [allergie](#) aux anesthésiques locaux,
- perforation du [tympan](#).

Attention

Bien que ce médicament puisse être acheté sans ordonnance, faites vérifier l'absence de perforation de votre [tympan](#) par votre médecin.



Sportif : les anesthésiques locaux ont été retirés de la liste des substances dopantes publiée dans les arrêtés du 20 avril et du 16 août 2004 par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Fertilité, grossesse et allaitement

Les substances contenues dans ce médicament ne passent pas dans le sang dans les conditions d'utilisation (le médecin vérifie avant la prescription que le [tympan](#) ne présente pas de perforation). Il peut être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament AURIGOUTTE

Réchauffer le flacon entre les mains avant l'emploi pour limiter la sensation désagréable liée à l'introduction d'un liquide froid dans l'oreille.

Pencher la tête sur le côté et introduire la solution dans l'oreille. Garder la tête dans cette position pendant 10 minutes (bain d'oreille).

Posologie usuelle :

- Adulte : 4 gouttes dans l'oreille à traiter, 3 fois par jour, pendant 5 jours.
- Enfant et [nourrisson](#) : 2 gouttes dans l'oreille à traiter, 3 fois par jour.

Conseils

En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours ou en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin.

Effets indésirables possibles du médicament AURIGOUTTE

Irritation, [réaction allergique](#) locale.

Troubles de l'audition ou de l'équilibre en cas de perforation du [tympan](#) (voir Attention).