

Décontractyl®

500 mg

MÉPHÉNÉSINE

Comprimés enrobés

sanofi aventis

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Composition

Méphénésine 500 mg

Excipients : amidon de maïs, carboxyméthylamidon sodique type A, carbonate de calcium, gel de silice, talc, stéarate de magnésium, OPADRY II n°85F24441 (macrogol 3000, dioxyde de titane, alcool polyvinylique, oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune, oxyde de fer noir), pour un comprimé enrobé.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé enrobé (Boîte de 24).

Classe pharmaco-thérapeutique

MYORELAXANT À ACTION CENTRALE (M : appareil locomoteur).

Titulaire et exploitant

sanofi-aventis France - 1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

Information médicale : N° vert 0800 222 555.

Appel depuis l'étranger : + 33 1 57 63 23 23.

Fabricant

SANOFI AVENTIS S.A. - Alcorcon (Madrid) - Espagne

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans), en traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- antécédent d'allergie à l'un des composants,
- porphyrie (maladie héréditaire).

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas de grossesse ou d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

11504506-01

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - allaitement

Grossesse

Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse.

Si vous découvrez au cours du traitement que vous êtes enceinte, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

Allaitement

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.

Conducteurs et utilisateurs de machines

Risque rare de somnolence.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

1 à 2 comprimés par prise, 3 fois par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Avaler les comprimés avec un peu d'eau.

Durée du traitement

EN CAS DE PERSISTANCE DES TROUBLES AU-DELÀ DE QUELQUES JOURS, NE PAS AUGMENTER LES DOSES ET CONSULTER VOTRE MÉDECIN.

Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas d'ingestion accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT MÉDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

Exceptionnellement : allergie grave avec baisse de la tension artérielle.

Rarement : nausées, vomissements, somnolence, éruption cutanée allergique.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS LA NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

Précautions particulières de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Mai 2008.