

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Bronchokod<sup>®</sup> sans sucre adultes 5 pour cent

carbocistéine

**solution buvable édulcorée à la saccharine sodique**

**SANOFI** 

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.  
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT ?
3. Comment prendre BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT ?
6. Informations supplémentaires.

### **1. QU'EST-CE QUE Bronchokod sans sucre adultes 5 pour cent, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Mucolytique. (R: Système Respiratoire).

Ce médicament est un fluidifiant des sécrétions bronchiques et facilite ainsi leur évacuation par la toux.

Ce médicament est indiqué chez l'adulte en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'expectoration (difficulté à rejeter en crachant les sécrétions bronchiques).

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Bronchokod sans sucre adultes 5 pour cent ?**

**Ne prenez jamais BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT dans les cas suivants :**

Si vous avez des antécédents d'allergie à l'un des constituants (notamment au parahydroxybenzoate de méthyle).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Faites attention avec BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT**

**Mises en garde spéciales**

Un avis médical est nécessaire :

- En cas d'expectoration grasse ou purulente, fièvre,
- Si vous êtes atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons,
- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

Ne pas prendre de médicament antitussif (destiné à calmer la toux sèche et la toux d'irritation) ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par la carbocistéine.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Précautions particulières d'emploi**

Ce médicament doit toujours être accompagné d'efforts volontaires de toux permettant l'expectoration (rejeter en crachant les sécrétions bronchiques).

Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 99,45 mg de sodium par cuillère à soupe (15 ml) de solution buvable. À prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Ce médicament contient 0,796 % de vol d'éthanol (alcool), c'est-à-dire jusqu'à 285 mg d'éthanol par dose journalière maximale, ce qui équivaut à 7,16 ml de bière ou 2,98 ml de vin maximum par jour. L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **Grossesse et allaitement**

En cas de grossesse ou d'allaitement, PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Liste des excipients à effet notoire** : parahydroxybenzoate de méthyle (E218), sodium, éthanol.

## **3. COMMENT PRENDRE Bronchokod sans sucre adultes 5 pour cent ?**

RÉSERVÉ À L'ADULTE.

### **Posologie**

Cette spécialité est adaptée aux patients suivant un régime hypoglucidique ou hypocalorique.

La posologie usuelle est de 750 mg par prise à raison de 3 prises par jour, soit 1 cuillère à soupe 3 fois par jour (1 cuillère à soupe = 15 ml).

### **Mode et voie d'administration**

Voie orale.

### **Durée du traitement**

La durée du traitement doit être brève.

Ne pas dépasser 5 jours de traitement sans avis médical.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Possibilité de troubles digestifs : douleurs d'estomac, nausées, diarrhées. Il est alors conseillé de réduire la posologie.
- Possibilité de réactions cutanées allergiques telles que urticaire, démangeaison, éruption cutanée, gonflement du visage (angio-œdème). Quelques rares cas d'érythème pigmenté fixe (tache cutanée brune) ont été rapportés.
- En raison de la présence de parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), risque de réactions allergiques éventuellement retardées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER Bronchokod sans sucre adultes 5 pour cent ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### Que contient BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT ?

#### La substance active est :

Carbocistéine ..... 5 g  
pour 100 ml.

#### Les autres composants sont :

saccharine sodique, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), hydroxyéthylcellulose, composition aromatique (*rhum, miel, cacao, orange, cerise, feuille de langue de cerf, fève tonka, réglisse, vanilline, éthylvanilline, maltol, acétylméthylcarbinol, acétate d'éthyle, colorant caramel, propylène glycol, éthanol (41% V/V)*), hydroxyde de sodium, eau purifiée.

### Qu'est-ce que BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de sirop. Flacon de 250 ml.

#### Titulaire et exploitant

sanofi-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

Information Patient : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

#### Fabricant

A NATTERMANN & Cie.

GmbH - Cologne - Allemagne

### La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Mars 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).