

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 28/01/2013

Dénomination du médicament

BRONCHODERMINE ADULTES, suppositoire

Indications thérapeutiques

Traitement d'appoint à visée décongestionnante au cours des affections respiratoires banales (rhumes, toux, bronchites simples).

Bronchodermine pommade tube dispositif doseur : Posologie et mode d'administration

Posologie :

Ne pas avaler.

Utiliser le dispositif doseur permettant de contrôler la quantité de pommade délivrée.

- Adulte : 1,7 g de pommade, 2 fois par jour maximum.
- Enfant de 6 à 15 ans : 1 g de pommade, 2 fois par jour maximum.
- Enfant de 30 mois à 6 ans : 1 g de pommade, une seule fois par jour.

Mode d'administration :

La dose étant choisie en fonction de l'âge, étaler la pommade sur la poitrine avec le bout des doigts.

Ne pas frictionner ni masser. Ne pas recouvrir avec un linge.

Se laver les mains après application.

Bronchodermine pommade tube dispositif doseur : Propriétés pharmacodynamiques

ASSOCIATION A VISEE ANTISEPTIQUE ET EXPECTORANTE.

(R : système respiratoire).

- Gaïacol : à visée expectorante.
- Cinéole, huile essentielle de pin : traditionnellement utilisés comme des antiseptiques des voies respiratoires. Ces dérivés terpéniques peuvent abaisser le seuil épileptogène.

Bronchodermine pommade tube dispositif doseur : Propriétés pharmacocinétiques

Sans objet.

Bronchodermine pommade tube dispositif doseur : Contre-indications

CONTRE-INDIQUE :

- Hypersensibilité à l'un des constituants.
- Enfant ayant des antécédents de convulsions (fébriles ou non).

- Ne pas appliquer sur les seins en cas d'allaitement.
- Peau lésée.
- Enfant de moins de 30 mois.

DECONSEILLE :

Allaitement : en raison de la toxicité neurologique potentielle des dérivés terpéniques chez le nourrisson, éviter l'administration de ce médicament chez la femme qui allaite.

Bronchodermine pommade tube dispositif doseur : Mises en garde et précautions d'emploi

MISES EN GARDE :

- Cette spécialité contient des dérivés terpéniques (cinéole, huile de pin) qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents neurologiques à type de convulsions chez l'enfant et le nourrisson.
- Respecter les posologies et les durées de traitement préconisées.
- Ne pas appliquer sur une surface étendue du corps.
- Ne pas appliquer sur les seins en cas d'allaitement.
- Ne pas appliquer chez l'enfant de moins de 30 mois.
- Respecter la posologie en fonction de l'âge et utiliser le dispositif doseur.
- En cas de réaction cutanée de type allergique ou irritatif, interrompre le traitement.
- Suspendre le traitement si la sensation de chaleur devient trop vive.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- En cas d'antécédent d'épilepsie, tenir compte de la présence de dérivés terpéniques.
- Si les symptômes persistent et/ou s'accompagnent de signes de surinfection, il conviendra de réévaluer la conduite thérapeutique.
- Eviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les plaies.
- Bien se laver les mains après usage.
- Grossesse : en clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour. Toutefois, le suivi de grossesses exposées à ce médicament est insuffisant pour exclure tout risque. En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas administrer ce médicament pendant la grossesse.

Bronchodermine pommade tube dispositif doseur : Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Sans objet.

Bronchodermine : Grossesse et allaitement

Grossesse :

En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour. Toutefois, le suivi de grossesses exposées à ce médicament est insuffisant pour exclure tout risque.

En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas administrer ce médicament pendant la grossesse.

Allaitement :

En raison de la toxicité neurologique potentielle des dérivés terpéniques chez le nourrisson, éviter l'administration de ce médicament chez la femme qui allaite.

Bronchodermine : Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Sans objet.

Bronchodermine pommade tube dispositif doseur : Effets indésirables

Possibilité de réaction allergique ou irritative.

En raison de la présence de dérivés terpéniques (cinéole, huile essentielle de pin) et en cas de non-respect des doses préconisées :

- possibilité d'agitation et de confusion chez le sujet âgé ;
- risque de convulsions chez l'enfant et le nourrisson.

Bronchodermine pommade tube dispositif doseur : Surdosage

Sensation de cuisson disparaissant à l'arrêt du traitement.

Bronchodermine : Données de sécurité précliniques

Sans objet.

Bronchodermine : Incompatibilités

Sans objet.