

Ostéocynésine®

COMPRIMÉ

FORME ET PRÉSENTATION

Boîte de 60 comprimés

COMPOSITION

Calcarea ostreica	3 DH
Calcarea fluorica	3 DH
Calcarea phosphorica	3 DH
Sulfur iodatum	4 CH

aa q.s.p. 1 comprimé de 0,30 g.

Excipients : saccharose, lactose, stéarate de magnésium

INDICATIONS

Médicament homéopathique

Décalcification.

Troubles de la croissance chez l'enfant.

Consolidation des fractures.

Convalescence.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

2 comprimés 2 à 3 fois par jour.

Les comprimés peuvent être sucés,
avalés ou écrasés dans un peu d'eau.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres,
contactez-le avant de prendre ce médicament.

PRECAUTIONS D'EMPLOI - MISES EN GARDE

En raison de la présence de saccharose, l'utilisation de ce médicament est
déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un
syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en
sucrase / isomaltase (maladies héréditaires rares).

En raison de la présence de lactose, l'utilisation de ce médicament est
déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose,
un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose
et du galactose (maladies héréditaires rares).

Visa 214.417



BOIRON cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine,
BOIRON participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination
respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non.
BOIRON vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

20, rue de la Libération

BOIRON®

69110 Ste-Foy-lès-Lyon - France