

# SCANIL CHIOTS ET PETITS CHIENS

NITROSCANATE • CHIOTS ET PETITS CHIENS > 2 KG



## COMPOSITION

Nitroscanate ..... 100 mg

Excipient q.s.p. 1 comprimé pelliculé de 131,5 mg.

## ESPÈCE CIBLE

Chiens.

## INDICATIONS

Chez les chiens et les chiots :

- Traitement des infestations par les cestodes ou les nématodes intestinaux suivants :

### • Nématodes

- *Toxocara canis*
- *Toxascaris leonina*
- *Ancylostoma caninum*
- *Uncinaria stenocephala*
- *Ancylostoma braziliense*

### • Cestodes

- *Taenia hydatigena*
- *Taenia pisiformis*
- *Dipylidium caninum*
- *Taenia ovis*
- *Spirometra erinacei*
- *Mesocestoïdes lineatus*

## CONTRE-INDICATIONS

Ne pas administrer à des animaux malades ou en convalescence.

Ne pas utiliser en cas de dysfonctionnement hépatique.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI CHEZ LES ANIMAUX

À administrer avec l'aliment (cf. rubrique « Posologie et voie d'administration ») pour réduire les risques de vomissements. Ceux-ci n'affectent toutefois pas l'activité anthelminthique du médicament s'ils surviennent plus de 30 minutes après l'administration.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR LA PERSONNE QUI ADMINISTRE LE MÉDICAMENT AUX ANIMAUX

Ne pas fractionner les comprimés.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Des troubles digestifs (vomissements, diarrhée, anorexie, nausée, ...) peuvent survenir dans des cas peu fréquents, notamment quand le produit n'est pas administré conformément aux recommandations.

La fréquence des effets indésirables est définie en utilisant la convention suivante :

- très fréquent (effets indésirables chez plus de 1 animal sur 10 au cours d'un traitement)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100)

- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000, y compris cas isolés).

#### UTILISATION EN CAS DE GRAVIDITÉ ET DE LACTATION

Le médicament peut être utilisé pendant la gestation ou la lactation et chez les mâles reproducteurs.

#### POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

50 mg de nitroscanate par kg de poids corporel par voie orale en administration unique, correspondant à 1 comprimé pelliculé par 2 kg de poids corporel.

Administer le traitement le matin avec le quart de la ration alimentaire journalière, attendre le soir pour donner le reste de la ration.

Boisson à volonté.

#### SURDOSAGE

Aucun symptôme clinique n'a été observé chez le chien et le chiot à des doses 20 fois supérieures à celle recommandée, même en cas d'administration répétée.

#### CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation. A conserver dans l'emballage extérieur d'origine.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

#### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE LORS DE L'ÉLIMINATION DE MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DE DÉCHETS DÉRIVÉS DE L'UTILISATION DE CES MÉDICAMENTS

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

#### PRÉSENTATION ET NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Film thermosoudé aluminium-polyéthylène.

Boîte de 6 comprimés.

A.M.M. n° FR/V/6362258 8/1985.

Fabricant

OPODEX – VILLENEUVE LA GARENNE (92).

TITULAIRE DE L'A.M.M.

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE

20, rue André Gide - BP 80 - 92321 Châtillon Cedex.

USAGE VÉTÉRINAIRE

DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

19/04/2016