



# EOSINE COOPER 2 %

## SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
3. Comment utiliser ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
6. Informations supplémentaires.

### **1. QU'EST-CE QUE ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament est un colorant qui assèche, très faiblement antiseptique.

Il est utilisé en traitement d'appoint des lésions de la peau pouvant se surinfecter, notamment l'érythème fessier du nourrisson (irritation et rougeur des fesses chez le nourrisson).

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?**

**N'utilisez jamais ce médicament :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'éosine.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Faites attention avec ce médicament :**

- Ne l'avalez pas.
- Tout flacon unidose entamé doit être utilisé dans les 48 heures pour éviter la contamination par des microbes.

En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

En particulier, évitez d'employer ce médicament en même temps qu'une autre solution pour application locale.

**Grossesse et allaitement :**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement. D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

**3. COMMENT UTILISER ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?****Posologie, mode et voie d'administration :**

Appliquez localement à l'aide d'une compresse stérile **1 à 2 fois par jour**, ou versez directement sur l'endroit à traiter (voie cutanée).

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

**Avertissez votre médecin si vous constatez les effets suivants :**

- éruptions localisées de la peau,
- photosensibilisation : sensibilité anormale à la lumière des surfaces traitées par ce médicament.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**5. COMMENT CONSERVER ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date limite de péremption mentionnée sur la boîte.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

**6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES****Que contient ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?**

La substance active est l'éosine disodique. 100 ml de ce médicament en contiennent 2,00 grammes.

L'autre composant est l'eau purifiée.

**Comment se présente ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale, contenue dans des récipients unidoses. Boîte de 10 récipients unidoses de 2 ml.

**Titulaire / Exploitant :**

 Coopération Pharmaceutique Française  
Place Lucien Auvert  
77020 MELUN CEDEX

**Fabricant :**

Laboratoire Unither  
Z.I. Longpre - 10, rue André Durouchez  
80084 AMIENS CEDEX 2

65NOT222/E

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 16 septembre 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).