

**COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT.  
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

Veillez lire l'intégralité de ces informations avant d'utiliser ce médicament. Voie orale. La dose habituelle est de 1 sachet-dose par tasse. Une tasse de tisane le soir 2 heures après le repas. Verser l'eau bouillante sur le sachet, et laisser infuser 5 minutes. Retirer le sachet, sucrer ou aromatiser à votre goût. La tisane doit être préparée au moment de la prise et utilisée aussitôt après. Ce médicament agit habituellement en 8 à 12 heures. La durée d'utilisation est limitée à 10 jours. La persistance des troubles au bout de 10 jours de traitement impose de prendre un avis médical. RESPECTEZ TOUJOURS LA POSOLOGIE INDIQUÉE PAR VOTRE MÉDECIN. EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN. Médicament non soumis à prescription médicale.

**ATTENTION ! DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER  
CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS) :**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :  
- certaines maladies inflammatoires de l'intestin et du côlon (rectocolite ulcéreuse, maladie de Crohn...), - en cas de douleurs abdominales (douleurs du ventre) de causes indéterminées, - en cas de constipation chronique (constipation de longue durée), - chez l'enfant de moins de 12 ans sans la prescription d'un médecin, - syndrome occlusif ou subocclusif (troubles liés à une obstruction du tube digestif). PAS D'UTILISATION PROLONGÉE SANS AVIS MÉDICAL. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**PRECAUTION D'EMPLOI :**

Ce médicament peut entraîner une perte de potassium. EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET  
AUTRES INTERACTIONS :**

L'association avec d'autres médicaments (comme certains diurétiques ou certains médicaments pour le cœur) peut être dangereuse.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment avec l'amiodarone, l'astémizole, le bépridil, le brétylium, le disopyramide, l'érythromycine par voie intraveineuse, l'halofantrine, la pentamidine, les quinidiniques, la sparfloxacine, le sotalol, le sultopride, la terfénadine et la vincamine, SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RÉCEMMENT UN AUTRE MÉDICAMENT, Y COMPRIS UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE, PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

**GROSSESSE ET ALLAITEMENT :**

Ce médicament est déconseillé chez la femme qui allaite. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

10 Sachets-dose