

# SEDACOLLYRE

Céthexonium 0,25 ‰

ANTISEPTIQUE

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

**DÉNOMINATION :** SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 POUR MILLE, collyre en solution.

### COMPOSITION :

Principe Actif : Bromure de céthexonium .....0,025g  
Excipients : Chlorure de sodium, eau pour préparations injectables q.s.p. ....100 ml

**FORME PHARMACEUTIQUE :** Collyre

**CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :** ANTISEPTIQUE LOCAL (S = organe des sens)

**TITULAIRE / EXPLOITANT :** COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Place Lucien Auvert - 77020 Melun Cedex

**FABRICANT :** EXCELVISION - Rue de la Lombardière - 07100 Annonay

## DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ? (INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)

Ce collyre est indiqué dans le traitement antiseptique des affections superficielles de l'œil et de ses annexes.

## ATTENTION ! DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ? (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'antécédents d'allergie au céthexonium ou autres ammoniums quaternaires. *EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

**MISES EN GARDES SPÉCIALES :** En cas d'apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l'œil), interrompre le traitement et consulter votre médecin.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS. NE PAS INJECTER, NE PAS AVALER. Utiliser ce médicament AVEC PRÉCAUTION :

- Ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.
- L'utilisation de ce collyre doit être évitée chez les porteurs de lentilles de contact chez qui le risque d'intolérance locale est majoré.
- Respecter la posologie préconisée et ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours.
- Refermer le flacon soigneusement après usage.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN*

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :** AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment avec les autres antiseptiques oculaires, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

**GROSSESSE-ALLAITEMENT :** D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

**POSOLOGIE :** Instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour.

**MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :** Voie locale. EN INSTILLATION OCULAIRE. En regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure vers le bas, instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour pendant 7 jours.

**UTILISATION DU FLACON :** Visser à fond le bouchon afin de percer l'embout du flacon. Après usage, refermer le flacon et le remettre dans sa boîte. Attention, ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.

**DURÉE DU TRAITEMENT :** En moyenne 7 jours. Ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS. Une réaction d'intolérance locale est possible. En cas d'apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l'œil) arrêtez le traitement et consultez votre médecin.


*SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.*

## CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

**PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :** Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 15 jours après l'ouverture du flacon. Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

**DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :** Avril 2009.



23279400



Place Lucien Auvert  
77020 Melun Cedex