

ANGISPRAY MAL DE GORGE CHLORHEXIDINE/LIDOCAÏNE

Mis à jour : Jeudi, 27 Août 2015.

Préparation antiseptique et antalgique pour la bouche et la gorge

Dans quel cas le médicament ANGISPRAY MAL DE GORGE CHLORHEXIDINE/LIDOCAÏNE est-il prescrit ?

Ce [collutoire](#) contient un [antiseptique](#) (chlorhexidine) qui a un effet antibactérien et un [anesthésique](#) local (lidocaïne) qui a un effet [antalgique](#).

Il est utilisé dans le traitement des affections de la bouche et de la gorge (maux de gorge peu intenses, aphtes).

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- [Angine et mal de gorge de l'adulte](#)
- [Angine et mal de gorge de l'enfant](#)
- [Aphtes](#)

Présentations du médicament ANGISPRAY MAL DE GORGE CHLORHEXIDINE/LIDOCAÏNE

ANGISPRAY MAL DE GORGE CHLORHEXIDINE/LIDOCAÏNE : [collutoire](#) (arôme menthe) ; flacon de 40 ml
- Non remboursé - Prix libre

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « [honoraires de dispensation](#) » du pharmacien.

Composition du médicament ANGISPRAY MAL DE GORGE CHLORHEXIDINE/LIDOCAÏNE

	p 100 ml
Lidocaïne chlorhydrate	250 mg
Chlorhexidine gluconate	100 mg
Menthe, essence	+
Substances actives :	Chlorhexidine gluconate , Lidocaïne chlorhydrate

Excipients : Alpha-pinène, Alpha-terpinène, Azote, Bêta-pinène, D-limonène, Eau purifiée, Glycérol, L-carvone, Lévomenthol, L-limonène, Menthe arôme, Menthofurane, Menthol, Menthone, Menthyle acétate, [Potassium](#) acésulfame

Contre-indications du médicament ANGISPRAY MAL DE GORGE CHLORHEXIDINE/LIDOCAÏNE

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'[allergie](#) aux anesthésiques locaux.

Attention

En cas de fièvre, de [gène](#) en avalant ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, consultez votre médecin. Il pourra faire la différence entre une [pharyngite](#) et une [angine](#). En cas d'[angine](#) bactérienne, un traitement [antibiotique](#) est nécessaire afin d'éviter des complications ultérieures, cardiaques ou rénales.

L'usage prolongé des traitements antiseptiques locaux ([gargarisme](#), [collutoire](#), pastille) n'est pas souhaitable ; il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.

Une surconsommation pourrait entraîner le passage de l'[anesthésique](#) local dans le sang et provoquer des troubles nerveux et cardiaques : respectez la [posologie](#).



Sportif : les anesthésiques locaux ont été retirés de la liste des substances dopantes publiée dans les arrêtés du 20 avril et du 16 août 2004 par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Interactions du médicament ANGISPRAY MAL DE GORGE CHLORHEXIDINE/LIDOCAÏNE avec d'autres substances

Il est généralement inutile d'associer des antiseptiques différents. Ceux-ci peuvent être contenus dans de nombreux produits disponibles en [automédication](#) : pastille, [collutoire](#) et solution nasale ; demandez conseil à votre pharmacien.

Fertilité, grossesse et allaitement

Ce médicament ne contient que des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament ANGISPRAY MAL DE GORGE CHLORHEXIDINE/LIDOCAÏNE

Les pulvérisations doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Posologie usuelle :

- Adulte : 1 pulvérisation, 4 à 5 fois par jour.
- Enfant de 6 à 15 ans : 1 pulvérisation, 2 à 3 fois par jour.

Conseils

Évitez l'usage de ce médicament avant les repas : l'[anesthésique](#) local est susceptible de provoquer des troubles de la déglutition ; ceux-ci pourraient être à l'origine du passage d'aliments dans les voies respiratoires.

Effets indésirables possibles du médicament ANGISPRAY MAL DE GORGE CHLORHEXIDINE/LIDOCAÏNE

[Réaction allergique.](#)

Engourdissement passager de la langue.

Coloration brune de la langue et des dents disparaissant à l'arrêt du traitement.