

Sargenor 1g

sans sucre

ASPARTATE D'ARGININE

**COMPRIMÉS
EFFERVESCENTS**

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMÉDICATION
 - Il est destiné à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans,
 - L'absence de guérison après 15 jours impose de prendre un avis médical.
- EN CAS DE DOUTE, NE JAMAIS HÉSITER À FAIRE APPEL À VOTRE MÉDECIN
OU À VOTRE PHARMACIEN.**

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

a. DÉNOMINATION

SARGENOR sans sucre 1g, comprimés effervescents édulcorés à la saccharine sodique.

b. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Aspartate d'arginine 1g

Excipients : acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, citrate de sodium, saccharine sodique, jaune orangé S (E110), silice colloïdale anhydre, arôme orange.

Pour un comprimé effervescent.

c. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés effervescents, boîte de 20 ou 40.

d. CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

ANTIASTHÉNIQUE (A : appareil digestif et métabolisme)

e. NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Exploitant :
MEDA Pharma
25, bd de l'Amiral Bruix, 75016 PARIS
Tél: 01 56 64 10 70

Fabricant :
HERMES Pharma Ges.m.b.H
Allgäu 36
9400 WOLFSBERG - AUTRICHE

2. DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un antiasthénique préconisé dans les états de fatigue passagers.

3. ATTENTION !

a. DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament **NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ** sans avis médical chez l'enfant de moins de 12 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament **AVEC PRÉCAUTION** en cas de régime sans sel ou pauvre en sel : chaque comprimé effervescent contient 100mg de sodium.

En cas de persistance de la fatigue après 15 jours de traitement ou si la fatigue s'accompagne de manifestations inhabituelles, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. La prise de ce médicament ne dispense pas de respecter les principales règles d'hygiène de vie telles que : activité physique régulière, alimentation équilibrée (notamment éviter la prise d'alcool, de tabac et/ou d'excitants), heures régulières de sommeil, repos.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

c. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament contient de l'aspartate d'arginine.

D'autres médicaments contiennent ces acides aminés.

Il est préférable de ne pas les associer afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir "comment utiliser ce médicament").

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

d. GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

e. LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS : Saccharine sodique, jaune orangé S, arôme orange.

4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

a. POSOLOGIE

Adultes : 2 à 3 comprimés par jour, en cure de 8 à 15 jours.

Enfants de plus de 12 ans : 1 à 2 comprimés par jour, en cure de 8 à 15 jours.

Ne pas dépasser la dose maximale de 3 comprimés par jour.

b. MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Avant de prendre ce médicament, faire dissoudre les comprimés effervescents dans un verre d'eau.

c. FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Les comprimés peuvent être indifféremment répartis dans la journée ou absorbés en une seule prise.

Ce médicament peut être pris le soir au coucher.

d. DURÉE DU TRAITEMENT

La durée du traitement est limitée à 15 jours.

e. CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de surdosage accidentel, arrêter le traitement et consulter rapidement votre médecin.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER, CHEZ CERTAINES PERSONNES, DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS. SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT.

6. CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR

Ce médicament doit être conservé à l'abri de l'humidité.

7. DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Janvier 2007

70251 J