

Paracétamol MYLAN

8 comprimés sécables

voie orale

1 g

Mylan

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

La substance active est :

Paracétamol. Pour un comprimé 1 g

sous forme de paracétamol COMPAP COARSE L

Les autres composants sont : povidone, acide stéarique, amidon prégélatinisé.

Titulaire - Exploitant :

MYLAN S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Fabricant :

MYLAN S.A.S.

Z.A.C. des Gaulnes

69330 MEYZIEU - FRANCE

Qu'est-ce que Paracétamol Mylan 1 g, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

Ce médicament est un antalgique, antipyrétique.

Ce médicament se présente sous forme de comprimé sécable en boîte de 8 comprimés.

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant pesant plus de 50 kg (environ 15 ans).

Lire attentivement la rubrique "Comment prendre Paracétamol Mylan 1 g, comprimé sécable ?".

Pour les enfants pesant moins de 50 kg, il existe d'autres présentations de paracétamol, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre Paracétamol Mylan 1 g, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais Paracétamol Mylan 1 g, comprimé sécable dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à l'un des constituants,
- maladie grave du foie.

Précautions particulières

- Si la douleur persiste **plus de 5 jours**, ou la fièvre **plus de 3 jours**, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.
- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Comment prendre Paracétamol Mylan 1 g, comprimé sécable ?").

**Grossesse - Allaitement**

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Signalez que vous ou votre enfant prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang.

Comment prendre Paracétamol Mylan 1 g, comprimé sécable ?

Attention ! Cette présentation contient 1 g de paracétamol par unité : ne pas prendre 2 comprimés à la fois.

**Posologie**

En raison de son dosage, ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg. La posologie usuelle est de un demi à 1 comprimé à 1 g par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures. En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum.

Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser la dose de 3 g de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour.

Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur avis de votre médecin, la posologie peut être augmentée jusqu'à 4 g par jour, soit 4 comprimés par jour.

Les doses supérieures à 3 g de paracétamol par jour nécessitent un avis médical.

- Ne jamais prendre plus de 4 g de paracétamol par jour, (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule).
- Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum. Ne pas dépasser 3 comprimés par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de Paracétamol Mylan 1 g, comprimé sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Mode et voie d'administration**

Voie orale.

Si besoin après l'avoir cassé en deux, le comprimé est à avaler tel quel avec une boisson (par exemple eau, lait, jus de fruit).

Si vous avez pris plus de Paracétamol Mylan 1 g, comprimé sécable que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Paracétamol Mylan 1 g, comprimé sécable : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Paracétamol Mylan 1 g, comprimé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables.

- Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle.

Il faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol.

- Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Comment conserver Paracétamol Mylan 1 g, comprimé sécable ?

Pas de précautions particulières de conservation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte, les plaquettes.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 01/2009