

LEHNING SOLUDOR TONICARDIAQUE

Notice

Solution buvable en gouttes

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien sur notre pharmacie en ligne.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien sur notre pharmacie en ligne.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien sur notre pharmacie en ligne.

1 - QU'EST-CE QUE LEHNING SOLUDOR TONICARDIAQUE, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé comme tonocardiaque et dans le traitement adjuvant des troubles vagotoniques [défaillances : stress, émotivité,...).

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LEHNING SOLUDOR TONICARDIAQUE, solution buvable en gouttes ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament !

Ne prenez jamais cette solution buvable en gouttes :

Si vous êtes hypersensible à l'un des composants contenu dans LEHNING SOLUDOR TONICARDIAQUE, solution buvable en gouttes.

Faites attention avec cette solution buvable en gouttes :

Ce médicament contient au maximum 23 % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu'à 136 mg par dose (30 gouttes], ce qui équivaut à 3,4 ml de bière, 1,4 ml de vin par dose.

L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien sur notre pharmacie en ligne.

Aliments et boissons:

Ce médicament est à prendre, de préférence, à distance des repas.

Grossesse et allaitement:

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien sur notre pharmacie en ligne avant de prendre tout médicament.

En raison de la présence d'alcool, ce médicament est déconseillé durant la grossesse et l'allaitement.

Informations importantes concernant certains composants de LEHNING SOLUDOR TONICARDIAQUE, solution buvable en gouttes:

Ce médicament contient de l'éthanol, du saccharose et du maltose.

3 • COMMENT UTILISER LEHNING SOLUDOR TONICARDIAQUE, solution buvable en gouttes ?

Adultes:

Traitement de fond : 3D gouttes 3 fois par jour.

En cas de défaillance : 1 prise supplémentaire de 50 gouttes.

Enfants à partir de 2 ans : quart de dose ou demi-dose selon l'âge.

Mode d'administration:

A prendre dans un peu d'eau, de préférence en dehors des repas.

Voie orale.

Si vous avez utilisé plus de solution buvable en gouttes que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien sur notre pharmacie en ligne.

Si vous avez oublié d'utiliser la solution buvable en gouttes:

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LEHNING SOLUDOR TONICARDIAQUE, solution buvable en gouttes est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien sur notre pharmacie en ligne.

5 - COMMENT CONSERVER LEHNING SOLUDOR TONICARDIAQUE, solution buvable en gouttes ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser cette solution buvable en gouttes après la date de péremption mentionnée sur la boîte ou sur l'étiquette.

Tenir le flacon soigneusement fermé.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien sur notre pharmacie en ligne ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6 - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient la solution buvable en gouttes ?

Les substances actives sont :

Aurum colloïdale 4 DH 1g,

Natrum muriaticum 3 DH 1g,

Crataegus oxyacantha TM 4 g,

Valeriana officinalis TM 4 g,

Avena sativa TM 2 g.

Cactus grandiflorus TM 4 g,

Camphora 3 DH 6 g.

Ignatia amara BDH 10 g,

Arnica montana 8 DH 6 g,

Strophanthus gratus 8 DH 6 g,

Kalium carbonicum 3DH 14 g, pour 100 g de solution buvable en gouttes.

Les autres composants sont : éthanol, éther, caramel, eau distillée.

Qu'est ce que LEHNING SOLUDOR TONICARDIAQUE, solution buvable en gouttes et contenu de l'emballage extérieur ?

LEHNING SOLUDOR TONICARDIAQUE, solution buvable en gouttes est une solution buvable conditionnée en flacon de verre jaune de 90 ml avec compte-gouttes sous un étui cartonné.