

# Paracétamol MYLAN



**8** comprimés  
effervescents sécables

 voie orale

**1000** mg

 **Mylan**

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.**

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

**La substance active est :** paracétamol (1000 mg).

**Les autres composants sont :** bicarbonate de sodium, acide citrique anhydre, povidone K30, laurilsulfate de sodium, sorbitol, saccharine sodique, carbonate de sodium anhydre, benzoate de sodium, leucine.

**Titulaire - Exploitant :**

**MYLAN S.A.S.**  
117 Allée des Parcs  
69800 SAINT-PRIEST  
FRANCE

**Fabricant :**

Unither Industries  
Site de Gannat  
Z.I. Le Malcourlet - B.P. 60  
03800 GANNAT - FRANCE

**Qu'est-ce que Paracétamol Mylan 1000 mg, comprimé effervescent sécable et dans quels cas est-il utilisé ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimés effervescents sécables. Boîte de 8 comprimés.

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans : lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

M.081938-A

050288C

A-839180.N

## Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre Paracétamol Mylan 1000 mg, comprimé effervescent sécable ?

 **Ne prenez jamais Paracétamol Mylan 1000 mg, comprimé effervescent sécable :**

- si vous avez une allergie connue au paracétamol ou à l'un des autres composants de ce médicament,
- si vous avez une maladie grave du foie.

 **Prendre des précautions particulières avec Paracétamol Mylan 1000 mg, comprimé effervescent sécable**

En raison de son dosage, ce médicament n'est pas adapté à l'enfant de moins de 15 ans.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

**Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. rubrique "Posologie").**

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose (*maladie métabolique héréditaire*).

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Ce médicament contient 375 mg de sodium par comprimé : en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel strict.

### **Grossesse - Allaitement**

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.**

### **Liste des excipients à effet notoire**

Sorbitol, sodium.

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

**Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.**

Signalez à votre médecin que vous prenez ce médicament s'il vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

M.081938-A

## Comment prendre Paracétamol Mylan 1000 mg, comprimé effervescent sécable ?

 Voie orale.

Boire immédiatement après avoir laissé dissoudre complètement le comprimé dans un verre d'eau.

**Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.**

Attention !

- Ce médicament contient 1000 mg de paracétamol par comprimé.
- Ne pas prendre 2 comprimés à la fois.

 La posologie usuelle est de 1/2 à 1 comprimé par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures. En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum.

Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3000 mg de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour.

Cependant, en cas de douleurs plus intenses, la dose maximale peut être augmentée jusqu'à 4000 mg de paracétamol par jour, soit 4 comprimés par jour. Toujours respecter un intervalle de 4 heures minimum entre les prises.

En cas de maladie grave des reins (*insuffisance rénale sévère*), les prises seront espacées de 8 heures minimum.

Ne pas dépasser 3 comprimés par jour.

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

**Si vous avez l'impression que l'effet de Paracétamol Mylan 1000 mg, comprimé effervescent sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.**

**Si vous avez pris plus de Paracétamol Mylan 1000 mg, comprimé effervescent sécable que vous n'auriez dû :** en cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenez en urgence un médecin.

**Si vous oubliez de prendre Paracétamol Mylan 1000 mg, comprimé effervescent sécable :** ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Paracétamol Mylan 1000 mg, comprimé effervescent sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables.

- Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption cutanée ou une réaction allergique. Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

M.081938-A

- Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains éléments du sang (*plaquettes*) pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

**Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.**

### **Comment conserver Paracétamol Mylan 1000 mg, comprimé effervescent sécable ?**

Conserver le tube soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité.

**Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.**

**Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.**

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 05/2008.**