

## NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 07/06/2006

Dénomination du médicament

EUPHON, sirop

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE EUPHON, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
  2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EUPHON, sirop ?
  3. COMMENT PRENDRE EUPHON, sirop ?
  4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
  5. COMMENT CONSERVER EUPHON, sirop ?
  6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
1. QU'EST-CE QUE EUPHON, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est un antitussif.

Indications thérapeutiques

Il est préconisé pour calmer les toux sèches, les toux d'irritation.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EUPHON, sirop ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

### **Ne prenez jamais EUPHON, sirop dans les cas suivants:**

- Enfant de moins de 30 mois.
- Insuffisance respiratoire.
- Toux de l'asthmatique.
- Allergie connue à l'un des constituants notamment parahydroxybenzoates de méthyle et de propyle ou au rouge cochenille A.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

### **Faites attention avec EUPHON, sirop**

#### **Mises en garde spéciales**

- Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.
- Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, d'expectoration (rejet, en crachant, des sécrétions bronchiques), de fièvre, demandez l'avis de votre médecin.
- En cas de maladie chronique (au long court) des bronches et des poumons s'accompagnant d'expectoration, un avis médical est indispensable.

<p><b>Attention !</b> Le titre alcoolique de ce sirop est de 2,7 % (V/V) soit 320 mg d'alcool pour une cuillère à soupe de sirop (15 ml) ou un godet à 15 ml, 213 mg pour un godet à 10 ml, 107 mg pour un godet à 5 ml.</p>
--

En raison de la présence de rouge cochenille A, ce médicament peut provoquer des réactions allergiques, voire de l'asthme, en particulier chez les personnes allergiques à l'aspirine.

#### **Précautions particulières d'emploi**

- Sujets âgés, insuffisants hépatiques (sujets atteints de maladies graves du foie).

- Les doses, en début de traitement seront diminuées de moitié et pourront ensuite être augmentées en fonction de l'effet de la tolérance.
- La prise de boissons alcoolisées durant ce traitement est déconseillée.
- Chez le diabétique: tenir compte de la teneur en sucre: 10,28 g par cuillère à soupe.

En raison de la présence d'alcool, prévenez votre médecin en cas de maladie du foie, d'épilepsie, de grossesse et d'allaitement.

Interactions avec d'autres médicaments

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Ce médicament contient un antitussif, la codéine. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les posologies maximales conseillées ([voir Posologie](#)).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### **Grossesse et Allaitement**

L'usage de ce médicament est déconseillé en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

### **Sportifs**

Attention, cette spécialité contient une substance pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

L'attention est appelée notamment chez les conducteurs de véhicules (automobiles, deux roues) et les utilisateurs de machines sur les possibilités de somnolence attachées à l'usage de ce médicament.

Ce phénomène s'atténue après plusieurs prises; il peut être préférable de commencer ce traitement le soir.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.

Liste des excipients à effet notoire

**Liste des excipients à effet notoire:** alcool, saccharose, rouge cochenille A (E124), parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et parahydroxybenzoate de méthyle de propyle (E216).

### 3. COMMENT PRENDRE EUPHON, sirop ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

#### **Fréquence d'administration**

Ce médicament n'est à administrer qu'aux horaires où survient la toux. Par exemple pour une toux ne survenant que le soir, une prise unique peut suffire. En l'absence d'efficacité, ne pas augmenter les doses au-delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif mais consultez votre médecin.

#### **Posologie**

La posologie usuelle est de:

- **Adulte:** 1 à 2 cuillères à soupe ou mesures graduées (godet) (15 ml) de sirop par prise à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin sans dépasser 4 prises par jour.

- **Enfant de plus de 12 ans:**

Utiliser le godet gradué.

Enfant de 40 à 50 kg (environ 12 à 15 ans): 1 mesure graduée (godet) à 15 ml ou 1 cuillère à soupe par prise, à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 4 prises par jour.

#### **Mode d'administration**

Voie orale.

Le traitement doit être court (quelques jours).

Symptômes et instructions en cas de surdosage

**Si vous avez pris plus de EUPHON, sirop que vous n'auriez dû:** demandez l'avis de votre médecin.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

**Si vous oubliez de prendre EUPHON, sirop:** reprendre le traitement conformément à la prescription.

Risque de syndrome de sevrage

**Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par EUPHON, sirop est arrêté:** aucun en dehors de la réapparition des troubles ayant motivé la prescription.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, EUPHON, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- constipation,
- somnolence,
- vertiges,
- nausées, vomissements,
- gêne respiratoire,
- réactions cutanées allergiques.

Ceci ne doit pas faire interrompre le traitement. Il faut en avertir votre médecin afin qu'il adapte la posologie.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### 5. COMMENT CONSERVER EUPHON, sirop ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser EUPHON, sirop après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

Le flacon doit être utilisé dans les 30 jours après ouverture.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

### Que contient EUPHON, sirop ?

#### **Les substances actives sont:**

Codéine  
..... 0,100  
g

Extrait sec aqueux sur maltodextrine d'érysimum officinale (maltodextrine incluse dans la masse d'extrait: 0,090 à 0,120 g)

.....  
0,300 g

Pour 100 ml de sirop

**Les autres composants sont:** acide citrique monohydraté, rouge cochenille A (E124), arôme naturel framboise (alcoolat, alcoolature et extraits concentrés de framboise), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), alcool, solution de saccharose, eau purifiée.

Titre alcoolique: 2,7 % V/V.

1 cuillère à soupe ou le godet gradué à 15 ml contient:

- 15 mg de codéine
- 10,28 g de saccharose
- 320 mg d'alcool absolu

1 godet gradué à 10 ml contient:

- 10 mg de codéine
- 6,85 g de saccharose
- 213 mg d'alcool absolu

1 godet gradué à 5 ml contient:

- 5 mg de codéine
- 3,43 g de saccharose
- 107 mg d'alcool absolu

Forme pharmaceutique et contenu

### **Qu'est-ce que EUPHON, sirop et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous la forme d'un sirop.

Flacon de 150 ml ou de 300 ml avec godet.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

Laboratoires MAYOLY SPINDLER SA

6, avenue de l'Europe

BP 51

78401 Chatou Cedex

Exploitant

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

6, avenue de l'Europe

BP 51

78401 CHATOU CEDEX

Fabricant

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

6, avenue de l'Europe

BP 51

78401 CHATOU CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d'approbation de la notice

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.**

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.