

Imodium duo®

comprimé



Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement :

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Imodiumduo®, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Imodiumduo®, comprimé ?
3. Comment prendre Imodiumduo®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Imodiumduo®, comprimé ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE IMODIUMDUO®, comprimé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Traitement de courte durée des diarrhées aiguës avec douleurs spasmodiques, ballonnements et flatulence.

Les comprimés contiennent deux substances actives :

- Le chlorhydrate de lopéramide, qui aide à réduire la diarrhée en ralentissant le transit intestinal. Il aide aussi à augmenter l'absorption de l'eau et des sels de l'intestin.
- La siméticone, qui agit en facilitant la coalescence des bulles de gaz dans l'intestin qui causent le ballonnement et les douleurs spasmodiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IMODIUMDUO®, comprimé ?

Ne prenez jamais IMODIUMDUO®, comprimé :

- chez l'enfant de moins de 12 ans,
- si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans Imodiumduo®, comprimé (voir section 6),
- si vous avez une fièvre importante (c'est-à-dire au dessus de 38°C) ou en cas de présence de sang dans les selles,

- si vous souffrez d'une maladie chronique de l'intestin ou du colon, notamment au cours des poussées aiguës de recto-colite hémorragique,
- si votre diarrhée survient après avoir pris des antibiotiques,
- si vous êtes constipé ou en cas de gonflement abdominal.

Faites attention avec IMODIUMDUO®, comprimé :

- IMODIUMDUO®, comprimé traite uniquement les symptômes de la diarrhée. Dans certains cas, la cause de la diarrhée doit être traitée, si les symptômes persistent ou s'aggravent, contactez votre médecin.
- Si vous souffrez de diarrhée sévère, votre corps perd davantage de liquide, de sucres et de sels qu'en temps normal. Vous devrez vous réhydrater en buvant plus de liquide que d'habitude. Demandez conseil à votre pharmacien sur les solutions de réhydratation qui compensent les pertes en liquide, en sucres et en sels.
- Si vous êtes porteur du virus du SIDA et que votre ventre gonfle, arrêtez immédiatement le traitement et contactez votre médecin.
- Si vous souffrez de maladies du foie, vérifiez auprès de votre médecin avant de prendre ce médicament. Certains des effets secondaires pourraient être davantage gênants.

Prise d'autres médicaments :

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments incluant :

- Quinidine (utilisé pour traiter les anomalies du rythme cardiaque et le paludisme)
- Itraconazole (médicament antifongique)
- Gemfibrozil (utilisé pour traiter un taux élevé de cholestérol)
- Ritonavir (utilisé pour traiter les infections au VIH et le SIDA)

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien car Imodiumduo® peut interagir avec eux.

Grossesse :

Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement :

Ne prenez pas Imodiumduo®, comprimé si vous allaitez. De petites quantités du médicament peuvent se retrouver dans votre lait.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Vous pouvez conduire des véhicules ou utiliser des machines excepté si vous ressentez de la fatigue, des vertiges ou si vous avez envie de dormir.

3. COMMENT PRENDRE IMODIUMDUO®, comprimé ?

Excepté si votre médecin vous a dit de faire autrement, suivez les instructions suivantes :

Adultes (à partir de 18 ans) :

Commencez par prendre 2 comprimés pour la première prise, puis si la diarrhée continue, prenez 1 comprimé supplémentaire après chaque selle non moulée. Ne pas dépasser 4 comprimés par jour. Si vous ne vous sentez pas mieux après 2 jours de traitement, arrêtez le médicament et contactez votre médecin.

Adolescents de 12 à 18 ans :

Commencez par prendre 1 comprimé pour la première prise, puis si la diarrhée continue, prenez 1 comprimé supplémentaire après chaque selle non moulée. Ne pas dépasser 4 comprimés par jour. Si vous ne vous sentez pas mieux après 2 jours de traitement, arrêtez le médicament et contactez votre médecin.

Ne pas donner les comprimés aux enfants de moins de 12 ans.

Si vous avez pris plus de IMODIUMDUO®, comprimé que vous n'auriez dû :

Trop de comprimés peuvent vous donner envie de dormir ou rendre difficile la réflexion ou la réalisation des activités normales. Vos muscles pourront se raidir ou vous pourrez avoir des difficultés à respirer. Vous pourrez avoir une bouche sèche ou vos pupilles pourront se rétrécir. Vous pourrez souffrir de douleur abdominale, avoir mal au cœur ou vomir, être constipé ou avoir des difficultés à uriner.

Si vous avez pris trop de comprimés, demandez conseil à un médecin ou à un hôpital.

Si vous oubliez de prendre IMODIUMDUO®, comprimé :

Prenez un comprimé après la prochaine selle non moulée. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, IMODIUMDUO®, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous ressentez un des symptômes suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez votre médecin : réaction allergique incluant un gonflement du visage, de la langue et de la gorge, des difficultés pour avaler, des éternuements inexpliqués, un raccourcissement du souffle qui peut être accompagné d'un rash cutané et d'un urticaire.

Si vous ressentez un de ces symptômes suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez votre médecin : difficulté à uriner, douleur ou gonflement de l'estomac, constipation sévère.

Autres effets pouvant survenir :

- Effets indésirables fréquents (moins de 1 sur 10 mais plus de 1 sur 100 personnes) : nausée, altération du goût
 - Effets indésirables peu fréquents (moins de 1 sur 100 mais plus de 1 sur 1000 personnes) : somnolence, constipation, éruption cutanée
 - Autres effets : Vomissement, indigestion, constipation, flatulence, vertige, perte ou diminution de la conscience
- Si un de ces effets indésirables devient sérieux, contactez immédiatement votre médecin ou l'hôpital.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER IMODIUMDUO®, comprimé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser IMODIUMDUO®, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte et les plaquettes.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Que contient IMODIUMDUO®, comprimé ?Les substances actives sont :

Chlorhydrate de lopéramide :	2 mg
Diméticone :	125 mg

Sous forme de siméticone

Pour un comprimé

Les autres composants sont :

Hydrogénophosphate de calcium anhydre, cellulose microcristalline, acésulfame potassique, arôme artificiel de vanille (contenant du : propylène glycol, maltodextrine et alcool benzylique), carboxyméthylamidon sodique et acide stéarique.

Qu'est ce que IMODIUMDUO®, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé blanc, en forme de gélule, gravé «IMO» sur une face et «2/125» sur l'autre face.

Boîte de 8 comprimés.

Titulaire / Exploitant :

Johnson & Johnson Santé Beauté France
1 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux

Fabricant :

Janssen-Cilag SPA - Via C. Janssen, Borgo San Michele - Latina (Italie)

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :

Belgique :	Imodium Duo 2/125 mg Tabletten
Danemark :	Imodium Plus
Finlande :	Imodium Plus Tabletit
Allemagne :	Imodium akut N Duo
Irlande :	Imodium Plus 2 mg / 125 mg tablets
Luxembourg :	Imodium Duo 2/125 mg Tabletten
Pays-Bas :	Imodium Duo 2/125 mg Tabletten
Norvège :	Imodium Comp
Portugal :	Imodium Plus 2 mg / 125 mg comprimidos
Espagne :	Imodium Duo 2 mg / 125 mg comprimidos
Suède :	Imodium Plus 2 mg / 125 mg tablett
Royaume-Uni :	Imodium Plus caplet

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Avril 2011

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Assaps (France).

Johnson & Johnson Santé Beauté France cotise à Adelphe pour les emballages de médicaments vendus en officine.



Johnson & Johnson Santé Beauté France participe de plus à Cyclaned, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Johnson & Johnson Santé Beauté France vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

FR - 982513 V