



Hexomedine[®]

0,1 pour cent
diisétionate d'hexamidine

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

gel pour application locale

SANOFI 

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale ?
3. Comment utiliser HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTISEPTIQUE POUR APPLICATION LOCALE

Ce médicament est un gel antiseptique pour application locale.

Ce médicament est préconisé dans l'antiseptie des petites plaies superficielles.

Traitement local d'appoint de certaines affections de la peau surinfectées.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale ?

N'utilisez jamais HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale dans les cas suivants:

- Antiseptie avant prélèvement (ponction, injection).
- Désinfection du matériel médico-chirurgical.
- En cas d'allergie aux dérivés de l'hexamidine.
- Sur les muqueuses.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale

Mises en garde

Ne pas utiliser sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau brûlée, une peau de prématuré ou de nourrisson.

Précautions d'emploi

Dès l'ouverture du tube, une contamination microbienne est possible. Veiller à utiliser le gel de façon hygiénique.

Reboucher le tube entre deux utilisations, déposer le gel sur des mains propres ou une compresse avant l'application sur l'endroit à traiter.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Éviter l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques différents avec cet antiseptique (notamment l'utilisation préalable de savon doit être suivie d'un rinçage soigneux).

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale ?**Posologie**

2 à 3 applications par jour.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- réactions allergiques locales possibles : rougeur, irritation, démangeaisons, sécheresse cutanée,
- des réactions allergiques plus importantes peuvent parfois survenir. Elles régressent lentement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de conditions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**Que contient HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale ?****La substance active est :**

Diisétionate d'hexamidine0,100 g
pour 100 g de gel pour application locale.

Les autres composants sont :

Hydroxyéthylcellulose, acide acétique glacial, alcool, eau purifiée.

Qu'est-ce que HEXOMÉDINE 0,1 POUR CENT, gel pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel pour application locale – tube de 30 g.

Titulaire et exploitant

sanofi-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris - France

Information Patient : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant

Sanofi Winthrop Industrie

45 200 Amilly – France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Octobre 2011/V1.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France).