

# PHLOROGLUCINOL MYLAN

80mg

DOULEURS SPASMODIQUES



20 COMPRIMÉS ORODISPERSIBLES  
voie orale

**Mylan**  
SANTÉ FAMILIALE

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.**  
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.  
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.  
Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

**La substance active est :** Pour un comprimé orodispersible

Phloroglucinol.....80 mg

**Les autres composants sont :** lactose monohydraté, cellulose microcristalline, crospovidone, povidone K90, stéarate de magnésium, aspartam (E951).

**Titulaire - Exploitant :**

MYLAN S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

**Fabricant :**

MYLAN S.A.S.

ZAC des Gaulnes

69330 MEYZIEU - FRANCE

## QU'EST-CE QUE PHLOROGLUCINOL Mylan 80 mg, comprimé orodispersible ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé orodispersible.  
Boîte de 20 comprimés.

Ce médicament est un antispasmodique.

Il est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

## QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER PHLOROGLUCINOL Mylan 80 mg, comprimé orodispersible ?

**Ne pas prendre Phloroglucinol Mylan 80 mg, comprimé orodispersible dans les cas suivants :**

- allergie connue au phloroglucinol ou à l'un des autres composants du produit (cf. "Composition"),
- en cas de phénylcétonurie (*maladie héréditaire dépistée à la naissance*), en raison de la présence d'aspartam.

**En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

**Prendre des précautions particulières avec Phloroglucinol Mylan 80 mg, comprimé orodispersible**

Si vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament, en raison de la présence de lactose.

Ce médicament contient une source de phénylalanine, il peut être dangereux pour les patients atteints de phénylcétonurie.

**En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**



## Grossesse - Allaitement

L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

**Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.**

## Liste des excipients à effet notoire

Aspartam, lactose.



## Prise ou utilisation d'autres médicaments

**Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.**

## COMMENT PRENDRE PHLOROGLUCINOL Mylan 80 mg, comprimé orodispersible ?



Voie orale.



**Chez l'adulte** : la posologie est de 2 comprimés à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants.

Les comprimés sont à laisser fondre sous la langue pour un effet rapide ou à dissoudre dans un verre d'eau avant ingestion.

**Chez l'enfant** : 1 comprimé 2 fois par jour, après dissolution dans un verre d'eau.

**Si vous avez l'impression que l'effet de Phloroglucinol Mylan 80 mg, comprimé orodispersible est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.**

## QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Phloroglucinol Mylan 80 mg, comprimé orodispersible est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- quelques très rares cas de réactions allergiques de la peau.

**Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.**

## COMMENT CONSERVER PHLOROGLUCINOL Mylan 80 mg, comprimé orodispersible ?

A conserver à une température ne dépassant pas + 30°C, à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte, les plaquettes.**

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 08/2005**