

CÉTIRIZINE

MYLAN
P H A R M A

dichlorhydrate de cétirizine

ALLERGIES

7 COMPRIMÉS
PELLICULÉS SÉCABLES
voie orale

10 mg



> 6 ans

Mylan
SANTÉ FAMILIALE



sur avis
médical

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

Cependant, compte-tenu de son indication dans le traitement des symptômes de l'urticaire chronique, un avis médical est recommandé pour vous aider à bien l'utiliser, au moins la première fois.

Si les symptômes persistent après 3 jours de traitement, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin. Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 3 jours de traitement, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CÉTIRIZINE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CÉTIRIZINE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE CÉTIRIZINE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CÉTIRIZINE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CÉTIRIZINE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le dichlorhydrate de cétirizine est la substance active de Cétirizine Mylan Pharma.

Cétirizine Mylan Pharma est un médicament antiallergique.

Chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans, Cétirizine Mylan Pharma est indiqué :

- pour le traitement des symptômes nasaux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle,
- pour le traitement des symptômes de l'urticaire chronique (urticaire chronique idiopathique).

Un avis médical est recommandé pour l'urticaire chronique idiopathique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CÉTIRIZINE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais Cétirizine Mylan Pharma 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- si vous avez une maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min) ;
- si vous êtes allergique à la substance active de Cétirizine Mylan Pharma ou à l'un des autres composants (excipients), à l'hydroxyzine ou aux dérivés de la pipérazine (substances apparentées contenues dans d'autres médicaments).

Faites attention avec Cétirizine Mylan Pharma 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Si vous avez une insuffisance rénale, demandez conseil à votre médecin ; si nécessaire, vous devrez prendre une dose inférieure. La posologie adaptée sera déterminée par votre médecin.

Si vous êtes épileptique ou si vous présentez des risques de convulsions, demandez conseil à votre médecin.

Il n'est pas décrit d'interaction susceptible d'avoir un effet particulier en cas de prise concomitante de cétirizine (utilisée aux doses normales) et d'alcool (jusqu'à la concentration sanguine de 0,5 pour mille correspondant à un verre de vin). Comme avec tout autre antihistaminique, il est néanmoins recommandé d'éviter la prise d'alcool pendant le traitement.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

En raison du profil de la cétirizine, aucune interaction avec d'autres médicaments n'est attendue.

Aliments et boissons

La prise alimentaire n'affecte pas significativement l'absorption de la cétirizine.

Grossesse - Allaitement

Comme pour d'autres médicaments, l'utilisation de Cétirizine Mylan Pharma doit être évitée pendant la grossesse. L'utilisation accidentelle lors de la grossesse ne devrait pas affecter le fœtus. Cependant, il est préférable par mesure de précaution d'éviter la poursuite du traitement.

Cétirizine Mylan Pharma ne doit pas être pris pendant l'allaitement en raison de son passage dans le lait maternel.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules ou utilisation de machines

Les études cliniques n'ont pas mis en évidence d'altération de la vigilance, du temps de réaction ou de la capacité à conduire après administration de Cétirizine Mylan Pharma aux doses recommandées.

Si vous êtes susceptible de conduire un véhicule ou de manipuler un outil ou une machine potentiellement dangereux, vous ne devez pas dépasser la dose recommandée. Vous devez évaluer soigneusement votre réponse au traitement par cétirizine au préalable.

Chez certains patients sensibles, l'utilisation concomitante d'alcool ou d'autres déprimeurs du système nerveux central peut entraîner une diminution de l'attention ou de la capacité à réagir.

Liste des excipients à effet notoire

Cétirizine Mylan Pharma contient du lactose.

3. COMMENT PRENDRE CÉTIRIZINE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Comment et quand devez-vous prendre Cétirizine Mylan Pharma ?

Ces instructions doivent être suivies sauf si votre médecin vous a donné des instructions différentes sur la manière d'utiliser Cétirizine Mylan Pharma. Suivez ces instructions, dans le cas contraire Cétirizine Mylan Pharma pourrait ne pas être complètement efficace.

Les comprimés doivent être avalés avec une boisson.

Adultes et adolescents de plus de 12 ans : 10 mg une fois par jour, soit 1 comprimé.

Enfants de 6 à 12 ans : l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez l'enfant de moins de 6 ans car cette forme ne permet pas l'adaptation posologique dans cette tranche d'âge. 5 mg deux fois par jour, soit un demi comprimé deux fois par jour.

Insuffisance rénale modérée à sévère :

Chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée à sévère, la dose sera réduite à 5 mg une fois par jour ou tous les deux jours selon la sévérité de l'insuffisance rénale (clairance de la créatinine).

Si vous pensez que l'effet de Cétirizine Mylan Pharma est trop faible ou trop fort, consultez votre médecin.

Durée du traitement

La durée du traitement dépend du type, de la durée et de vos symptômes et est déterminée par votre médecin.

Si vous avez pris plus de Cétirizine Mylan Pharma 10 mg, comprimé pelliculé sécable que vous n'auriez dû
Contactez votre médecin si vous pensez que vous avez pris plus de comprimés de Cétirizine Mylan Pharma qu'il ne le fallait. Votre médecin décidera alors, si nécessaire, des mesures à prendre.

En cas de surdosage, les effets indésirables décrits ci-dessous peuvent apparaître avec une intensité augmentée. Des effets indésirables tels que confusion, diarrhée, vertige, fatigue, céphalée, sensation de malaise, dilatation des pupilles, démangeaison, agitation, sédation, somnolence, stupeur, augmentation anormale du rythme cardiaque, tremblements et rétention urinaire ont été rapportés.

Si vous oubliez de prendre Cétirizine Mylan Pharma 10 mg, comprimé pelliculé sécable
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Cétirizine Mylan Pharma 10 mg, comprimé pelliculé sécable
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Cétirizine Mylan Pharma 10 mg, comprimé pelliculé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Depuis la commercialisation, les effets indésirables suivants ont été rapportés.

Leur fréquence a été définie comme : *Fréquent* : de 1 patient sur 100 à 1 sur 10 ; *Peu fréquent* : de 1 sur 1000 à 1 sur 100 ; *Rare* : de 1 sur 10000 à 1 sur 1000 ; *Très rare* : moins de 1 sur 10000.

- **Affections hématologiques et du système lymphatique :**
Très rare : thrombocytopénie (*diminution des plaquettes sanguines*).
- **Troubles de l'état général :** *Fréquent* : fatigue.
- **Affections cardiaques :**
Rare : tachycardie (*battements du cœur trop rapides*).
- **Affections oculaires :**
Très rare : troubles de l'accommodation, vision floue, crises oculogyres (*mouvements circulaires incontrôlés des yeux*).
- **Affections gastro-intestinales :**
Fréquent : sécheresse de la bouche, nausée, diarrhée.
Peu fréquent : douleur abdominale.
- **Troubles généraux et anomalies au site d'administration :**
Peu fréquent : asthénie (*fatigue extrême*), malaise.
Rare : œdème (*gonflement sous-cutané*).
- **Affections du système immunitaire :**
Rare : réactions allergiques, parfois graves (*très rare*).
- **Affections hépatobiliaires :**
Rare : anomalie du fonctionnement du foie.
- **Investigations :** *Rare* : prise de poids.
- **Affections du système nerveux :**
Fréquent : vertige, céphalée.
Peu fréquent : paresthésie (*sensation anormale au niveau de la peau*).
Rare : convulsions, mouvements anormaux.
Très rare : syncope, tremblement, dysgueusie (*altération du goût*).
- **Affections psychiatriques :**
Fréquent : somnolence.
Peu fréquent : agitation.
Rare : agressivité, confusion, dépression, hallucination, insomnie.
Très rare : tic.
- **Affections du rein et des voies urinaires :**
Très rare : difficulté à uriner.
- **Affections respiratoires :** *Fréquent* : pharyngite, rhinite.
- **Affections de la peau et du tissu sous-cutané :**
Peu fréquent : prurit, éruption cutanée.
Rare : urticaire.
Très rare : œdème, érythème pigmenté fixe.

Si vous développez un des effets indésirables mentionnés ci-dessus, veuillez en informer votre médecin. Aux premiers signes de réaction allergique, arrêtez de prendre Cétirizine Mylan Pharma. Votre médecin en évaluera la sévérité et décidera des mesures à prendre si nécessaire.

Si vous ressentez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CÉTIRIZINE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Cétirizine Mylan Pharma 10 mg, comprimé pelliculé sécable après la date de péremption mentionnée sur la boîte et le blister. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient Cétirizine Mylan Pharma 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

La substance active de Cétirizine Mylan Pharma est le :
Dichlorhydrate de cétirizine.

Un comprimé pelliculé contient 10 mg de dichlorhydrate de cétirizine.
Les autres composants sont : lactose monohydraté, amidon de maïs pré-gélatinisé, povidone K29/K32, stéarate de magnésium.
Pelliculage : OPADRY Y-1-7000 [dioxyde de titane (E 171), hypromellose, macrogol 400].

Qu'est ce que Cétirizine Mylan Pharma 10 mg, comprimé pelliculé sécable et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés pelliculés sécables. Boîte de 7.

Titulaire - Exploitant :	Fabricant :
MYLAN S.A.S.	MYLAN S.A.S.
117 Allée des Parcs	ZAC des Gaulnes
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE	69330 MEYZIEU - FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est :
05/2010

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'AFSSAPS (France).

Conseils / éducation sanitaire

Qu'appelle t'on allergie, qu'est-ce qu'une réaction allergique ?

L'allergie est une réaction excessive de notre organisme vis-à-vis de substances qu'il considère comme nocives : les allergènes. Les allergènes sont les facteurs et substances déclenchant l'allergie et les troubles qui y sont associés.

Au cours de contacts répétés et intensifs de notre organisme avec l'allergène, une réaction allergique se déclenche.

La réaction allergique désigne l'ensemble des symptômes apparaissant quelques minutes ou quelques heures après l'exposition aux allergènes. Ces allergènes sont issus de plantes, de poils d'animaux, d'aliments, d'acariens, de moisissures ou sont des substances d'origine professionnelle.

Cette réaction allergique provoque la libération dans l'organisme de substances telles que l'histamine responsable des troubles ressentis.

Comme toute maladie de nature allergique, il est important de consulter un médecin au moins une fois. Il déterminera notamment la nécessité d'effectuer un bilan allergologique.

Comment reconnaître une rhinite allergique, une conjonctivite allergique saisonnière ou non saisonnière, l'urticaire aiguë localisée ?

La rhinite allergique se traduit par les symptômes suivants : éternuements successifs, écoulement nasal incolore, obstruction nasale (*nez bouché*), démangeaisons et picotements du nez. Elle peut être accompagnée d'irritations des deux yeux (*larmoiments, rougeurs*), de la gorge et du nez.

On distingue :

- Les rhinites allergiques saisonnières ou rhume des foins : elles surviennent chaque année à la même saison, lorsque la concentration des pollens augmente dans l'air. Ces allergies dues aux pollens sont très fréquentes et se manifestent généralement pour la première fois pendant l'adolescence. Elles se répètent chaque année à la même période, en fonction de la présence du ou des pollens responsables. Cependant, vous n'êtes pas allergique à tous les pollens, mais à un ou plusieurs d'entre eux seulement.
- Les rhinites allergiques perannuelles se manifestent tout au long de l'année et dépendent le plus souvent des allergènes domestiques comme les acariens, la poussière, les moisissures, les animaux domestiques.
- La conjonctivite allergique se caractérise par des larmoiments et picotements des deux yeux.
- L'urticaire aiguë localisée se traduit par des plaques avec démangeaisons, rougeur, œdème (gonflement).

Quelques conseils pratiques

Faire disparaître l'allergène (c'est l'éviction) est la mesure de choix pour supprimer ou réduire les symptômes de l'allergie.

Pour les allergènes de maison : il est indispensable de prendre des mesures pour réduire la présence d'allergène :

- Le matelas devra être totalement entouré d'une housse plastique anti-acariens ainsi que les oreillers. Le sommier, sauf s'il est en lattes ou en métal, devra être entouré d'un plastique. Toute la literie devra être lavée deux fois par mois à 60° C si possible.
- La chambre doit être aérée et nettoyée régulièrement.
- Sur le sol, on évitera les descentes de lit et les moquettes.
- Evitez les animaux domestiques.

Pendant la saison pollinique, il est possible de diminuer l'exposition aux pollens :

- Dans votre jardin, diversifiez les plantations en évitant les espèces les plus allergisantes (cyprès, thuyas, bouleaux...).
- Evitez de tondre vous-même le gazon pendant la saison pollinique.
- Jardinez de préférence avec des lunettes et un masque de protection.