



- Solution buvable
- Flacon de 30 ml
- 1 pipette graduée

WOMBYL[®] PA

Préparation de la mise-bas
et prévention des complications
bénignes post-partum

Dans quel cas l'utiliser ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé en pré et peri-partum pour faciliter la mise-bas et prévenir d'éventuelles complications bénignes post-partum.

Composition

- Cantharis 5 CH
- Actaea racemosa 4 CH
- Aletris farinosa 4 CH
- Excipient : éthanol à 15 % V/V

Comment l'utiliser ?

**Facile à administrer
grâce à sa forme
buvable en gouttes.**

**A administrer à l'aide
de la pipette graduée
par voie orale :**

- Directement dans la bouche de l'animal.
- Ou diluer dans l'eau de boisson.
- Ou mélanger à l'aliment.



Posologie :

20 gouttes par tranche de 20 kg de poids corporel.

Poids de l'animal (kg)	Jusqu'à 20	21>40	41>60	61>80	...
Nb de gouttes par prise	20	40	60	80	...

Fréquence d'administration :

toutes les 6 heures.
Commencer la veille du jour présumé de la mise-bas jusqu'à la mise-bas.
Puis renouveler entre chaque naissance et poursuivre toutes les 6 heures, pendant 2 jours.





WOMBYL® PA

 Solution buvable

WOMBYL® PA solution buvable. **COMPOSITION :** Cantharis 5 CH, Actaea racemosa 4 CH, Aletris farinosa 4 CH aa. **FORME PHARMACEUTIQUE :** solution buvable. **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES :** médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques. **INFORMATIONS CLINIQUES : Espèces cibles :** Chiens, chats. **Indications thérapeutiques :** chez les chiennes et les chattes : médicament homéopathique traditionnellement utilisé en pré et péri-partum pour faciliter la mise-bas et prévenir d'éventuelles complications bénignes post-partum. **Précautions particulières d'emploi :** consulter un vétérinaire si les symptômes persistent. Utilisation en cas de gravidité et de lactation : l'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation. **Posologie et mode d'administration :** voie orale. 20 gouttes par tranche de 20 kg de poids corporel toutes les 6 heures. Commencer la veille du jour présumé de la mise-bas jusqu'à la mise-bas. Puis renouveler entre chaque naissance et poursuivre toutes les 6 heures pendant 2 jours. Administrer directement dans la bouche de l'animal à l'aide de la pipette graduée ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment. **INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES : Liste des excipients :** éthanol à 15 % V/V. **Durée de conservation :** 5 ans. Après ouverture : 1 an. **Précautions particulières de conservation :** ne pas conserver à une température supérieure à 25° C. **Nature et composition du conditionnement primaire :** Flacon verre type III, bouchon polyéthylène. **Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments :** les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets. **TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ :** Boiron - 20, rue de la Libération - 69110 - Sainte-Foy-lès-Lyon. **N° D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ :** boîte de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette graduée : FR/V/2761644/2009. Médicament vétérinaire non soumis à prescription.

Boiron à votre écoute :

 **0 810 809 810**

PREX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE


BOIRON®

