

Ciclopirox MYLAN

8 %

1 flacon de 3 ml avec pinceau
vernis à ongles médicamenteux

voie cutanée

 Mylan

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

La substance active est : Pour 100 g de vernis à ongles médicamenteux
Ciclopirox..... 8 g

Les autres composants sont :

Acétate d'éthyle, alcool isopropylique, ester butylique du copolymère d'éther méthylvinyle et d'acide maléique.

Titulaire - Exploitant :

MYLAN S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 SAINT PRIEST - FRANCE

Fabricant :

Laboratoires Chemineau

93, route de Monnaie - BP 16

37210 VOUVRAY - FRANCE

Qu'est-ce que Ciclopirox Mylan 8 %, vernis à ongles médicamenteux et dans quels cas est-il utilisé ?

Ce médicament se présente sous forme de vernis à ongles médicamenteux. Flacon de 3 ml avec un pinceau.

AUTRES ANTIFONGIQUES À USAGE TOPIQUE

Ce médicament est préconisé dans le traitement des mycoses des ongles (*affections dues à des champignons*).

Quelles sont les informations nécessaires avant d'utiliser Ciclopirox Mylan 8 %, vernis à ongles médicamenteux ?

Ne pas utiliser Ciclopirox Mylan 8 %, vernis à ongles médicamenteux si vous avez une allergie à l'un des composants (voir composition).

En cas de doute il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

M.082586-A

Prendre des précautions particulières avec Ciclopirox Mylan 8 %, vernis à ongles médicamenteux :

Précautions d'emploi

Ne pas avaler.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.



Grossesse

L'effet de ce médicament pendant la grossesse n'est pas connu. Son utilisation est déconseillée chez la femme enceinte.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

Comment utiliser Ciclopirox Mylan 8 %, vernis à ongles médicamenteux ?



Posologie

- Appliquer Ciclopirox Mylan 8 %, vernis à ongles médicamenteux sur tous les ongles du membre atteint une fois par jour de préférence le soir.
- **Conserver le flacon debout après chaque utilisation.**
- Eviter de se brosser les ongles avec un savon trop alcalin après l'application du produit.
- Une fois par semaine, l'utilisation d'une solution dissolvante cosmétique permet d'enlever la couche filmogène à la surface de l'ongle qui pourrait, à la longue, nuire à la pénétration du principe actif.

Durée de traitement

La durée du traitement est fonction de la localisation :

- environ 3 mois pour une mycose des doigts,
- environ 6 mois pour une mycose des orteils.



Voie cutanée, réservé à l'usage externe.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Ciclopirox Mylan 8 %, vernis à ongles médicamenteux est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- une réaction locale allergique de la peau est possible.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Comment conserver Ciclopirox Mylan 8 %, vernis à ongles médicamenteux ?

A conserver à une température ne dépassant pas +30°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte, le flacon.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 10/2008